

Хирургическое лечение митрального стеноза в сочетании с массивным тромбозом левого предсердия

Попов В.В., Мнишенко В.И., Клименко Л.А., Спикаренко С.П., Малышева Т.А.

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН»
(Киев)

Изучены особенности хирургического лечения митрального порока, осложненного массивным тромбозом левого предсердия, в условиях искусственного кровообращения. В проанализированную группу включены 334 пациента, прооперированных с 1 января 1984 до 1 января 2013 года. Госпитальная летальность за период с 1999 по 2012 год составила 4,8%. Причинами летальных случаев были острые сердечная недостаточность ($n=2$), поражение ЦНС (тромбоэмболия) ($n=3$), кровотечение ($n=3$). Факторами риска на госпитальном этапе были малая полость ЛЖ КСО/S <15 мл/м², sistолическое давление в легочной артерии >90 мм рт.ст., поражение триkuspidального клапана, предшествующая закрытая митральная комиссуротомия, гигантское левое предсердие, кальциноз митрального клапана +3.

Хирургическая коррекция МП, осложненного МТЛП, является операцией повышенного риска и сопровождается высокой летальностью. Для отдаленного периода характерна повышенная частота тромбоэмбологических осложнений при большей эффективности коррекции в случае выполнения клапаносберегающих операций.

Ключевые слова: митральный стеноз, массивный тромбоз левого предсердия, хирургическая коррекция, тромбоэмбологические осложнения.

Массивный тромбоз левого предсердия представляет собой один из сложных разделов хирургии приобретенных пороков сердца [1, 2, 4]. Несмотря на имеющийся клинический опыт, госпитальная летальность при хирургической коррекции массивного тромбоза левого предсердия все еще превышает уровень таковой при неосложненной коррекции митрального порока [3–5].

Хирургическое лечение митрального порока в сочетании с массивным тромбозом левого предсердия является операцией высокого риска и сопровождается повышенной госпитальной летальностью, поскольку обусловлено повышенной частотой тромбоэмбологических осложнений на госпитальном этапе и в отдаленный период.

Целью исследования является изучение особенностей хирургического лечения митрального порока в условиях искусственного кровообращения, осложненного массивным тромбозом левого предсердия.

Задача исследования – улучшить непосредственные и отдаленные результаты хирургической коррекции митрального порока, осложненного массивным тромбозом левого предсердия.

Материал и методы. В анализируемую группу включены 334 пациента с митральным стенозом, осложненным массивным тромбозом левого предсердия, находившиеся на хирургическом лечении в Институте сердечно-сосудистой хирургии НАМН с 01 января 1984 года до 01 января 2013 года. Тромбоз левого предсердия признавался массивным тогда, когда тромботические массы занимали не менее одной трети его объема, не считая его ушка. Генез поражения митрального стеноза в большинстве случаев был ревматический.

кий. “Чистый” либо преобладающий митральный стеноз был отмечен во всех случаях, и все пациенты находились в IV классе NYHA. Мужчин было 133 (39,8%), женщин – 201 (60,2%). Возраст оперируемых составил $57,2 \pm 5,2$ (19–70 лет). Средняя длительность существования мерцательной аритмии составила $4,1 \pm 0,8$ года.

Кальциноз митрального клапана (Мк) отмечен у 291 (87,1%) пациента. Предшествующая закрытая митральная комиссуротомия отмечена в 93 (27,8%) случаях, а у 6 пациентов она имела место 2 раза (рекомиссуротомия). Дооперационные эпизоды тромбоэмболии наблюдались у 85 (25,4%) пациентов.

Следующие процедуры были выполнены во время операции: изолированное протезирование митрального клапана ($n=255$), протезирование митрального клапана + пластика трикуспидального клапана по Амосову–de Vega ($n=47$), изолированная открытая митральная комиссуротомия ($n=28$), открытая митральная комиссуротомия + пластика трикуспидального клапана по Амосову–de Vega ($n=4$). Использовались только механические протезы: МКЧ-25, МКЧ-27 ($n=29$), монодиск ($n=116$), двухстворчатые ($n=157$). Операции выполнены в условиях ИК, умеренной гипотермии ($27\text{--}32$ °C), в условиях кристаллоидной кардиоплегии. Время пережатия аорты составило $73,2 \pm 9,2$ мин., а время искусственного кровообращения – $103,2 \pm 11,5$ мин.

В оптимальном варианте при наличии массивного тромбоза левого предсердия тромботические массы удалялись вместе с его основанием–выстилкой. Этой процедуре мы придаём принципиальное значение, поскольку остающаяся шероховатость на стенке левого предсердия приводит в раннем послеоперационном периоде, а затем и в отдаленном периоде к рецидивам отложения тромботических масс на шероховатой поверхности основания–выстилки и в дальнейшем к тромбоэмбическим осложнениям. При радикальности удаления тромботических масс разрывы стенки левого предсердия имели место у 6 (1,7%) пациентов с последующим ушиванием.

Лигирование ушка левого предсердия также является важным и обязательным элементом операции. Для снижения риска тромбообразования в послеоперационном периоде ушко левого предсердия прошивалось изнутри либо перевязывалось снаружи после удаления из него тромбов, поскольку при наличии мерцательной аритмии риск тромбоэмбических эпизодов из этой зоны особенно велик. Примененная методика Лабиринт-3 для восстановления ритма у 4 пациентов эффекта не дала.

Результаты и их обсуждение Госпитальная летальность за период (1999–2012 гг.) составила 4,7%. Причинами летальных исходов явились острая сердечно–сосудистая недостаточность ($n=4$), поражение центральной нервной системы (тромбоэмболия) ($n=3$), кровотечение ($n=4$), полиорганная недостаточность (1). Госпитальная летальность при протезировании митрального клапана (в том числе в сочетании с коррекцией трикуспидального клапана) составила 6,1% и 0% при выполнении открытой митральной комиссуротомии.

Таким образом, суммируя факторы риска, существенно влияющие на результат при коррекции у пациентов данной категории, следует выделить следующие: малая полость левого желудочка – конечно–систолический объем левого желудочка / $S < 15$ мл/м кв., систолическое давление в легочной артерии > 90 мм рт.ст., предшествующая закрытая митральная комиссуротомия, левая атриомегалия, кальциноз митрального клапана + 3. Комбинация данных факторов риска увеличивает величину госпитальной летальности.

В отдаленном периоде (средний $18,2 \pm 3,1$ г.) летальность составила при протезировании митрального клапана 28,2% (245 пациентов), а при открытой митральной комиссуротомии – 10,2% (102 пациента).

ротомии – 5,8% (27 пациентов). Тромбоэмбolicкие события при протезировании митрального клапана имели место в 28,2% случаев, а при открытой митральной комиссуротомии отмечены в 5,2% ($p < 0,05$). Тромбоэмбolicкие события имели место при протезировании митрального клапана и удалении тромботический выстилки в сочетании с лигированием ушка левого предсердия в 5,2% случаев, а при отсутствии данной процедуры отмечены в 29,8% ($p < 0,05$).

Выводы. При выполнении хирургической коррекции у пациентов с массивным тромбозом левого предсердия важным элементом операции является удаление основания-выстилки и перевязка ушка левого предсердия, что существенно снижает риск госпитальной летальности, тромбоэмбolicких осложнений на госпитальном этапе и в отдаленный период.

В отдаленном периоде после операций на митральном клапане наблюдаются тромбоэмбolicкие осложнения. У пациентов после открытой митральной комиссуротомии отмечен более низкий уровень тромбэмбolicких осложнений, чем после протезирования митрального клапана. Это свидетельствует о целесообразности выполнения клапаноохраняющих процедур.

Література

1. Ситар Л. Л., Попов В. В. Хирургическая коррекция митрального стеноза, осложненного массивным тромбозом левого предсердия // Грудная хирургия. – 1984. – № 3. – С. 16–18.
2. Кнышов Г. В., Бендет Я. А. Приобретенные пороки сердца. – К., 1998. – С. 312.
3. Иванов В. А. Реконструктивные клапаносберегающие операции при приобретенных пороках митрального и аортального клапанов сердца: Автореферат дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1989. – С. 21.
4. Попов В. В. Протезирование митрального клапана при осложненных формах митрального стеноза (кальциноз, грубый фиброз клапана, массивный тромбоз левого предсердия): Дис. ... канд. мед. наук. – К., 1988. – С. 21.
5. Попов В. В. Массивный тромбоз левого предсердия при митральном стенозе (особенности клиники и профилактики тромбэмбolicких осложнений при операциях с искусственным кровообращением) / Профилактика, диспансеризация, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. – Рига, 1985. – С. 244–245.

Хірургічне лікування мітрального стеноzu в поєднанні з масивним тромбозом лівого передсердя

Попов В.В., Мнішенко В.І., Клименко Л.А., Списаренко С.П., Малишева Т.А.

Вивчено особливості хірургічного лікування мітральної вади, ускладненої масивним тромбозом лівого передсердя, в умовах штучного кровообігу. В проаналізовану групу включено 334 пацієнти, прооперовані з 1 січня 1984 до 1 січня 2013 року. Госпітальна летальність за період з 1999 по 2012 рік склала 4,8%. Причинами летальних випадків були гостра серцева недостатність ($n=2$), ураження ЦНС (тромбоемболія) ($n=3$), кровотеча ($n=3$). Факторами ризику на госпітальному етапі були мала порожнина ЛШ КСО/S $< 15 \text{ мл}/\text{м}^2$,sistолічний тиск у легеневій артерії $> 90 \text{ мм рт.ст.}$, ураження трикуспідального клапана, попередня закрита мітральна комисуротомія, велетенське ліве передсердя, кальциноз мітрального клапана +3.

Хірургічна корекція MB, ускладненої МТЛП, є операцією підвищованого ризику і супроводжується високою летальністю. Для віддаленого періоду характерна підвищена частота тромбоемболічних ускладнень при більшій ефективності корекції у випадку виконання клапанозберігаючих операцій.

Ключові слова: масивний тромбоз лівого передсердя, протезування мітрального клапана, відкрита мітральна комісуротомія, штучний кровообіг.

Surgical Treatment of Mitral Valve Diseases in Combination of Massive Thrombosis of Left Atrium

Popov V.V., Mnischenko V.I., Klimenko L.A., Spisarenko S.P., Malysheva T.A.

Peculiarities of surgical treatment of mitral valve disease complicated with massive thrombosis of left atrium with cardiopulmonary bypass was examined. Analyzed group consists of 334 patients operated from 01 January 1984 till 01 January 2013 y. Massive thromboses of left atrium was defined in patients with volume of thrombotic masses was more than 1/3 of hole volume of left atrium not counted volume of auriculum. Mitral stenoses clear or predominated was marked in all cases. The following procedures were performed during operation: mitral valve replacement (n=302), open mitral commissurothomy (n=32). Hospital mortality in cases of mitral valve replacement was 6.1% and in cases of open mitral commissurothomy – 0%. Specific lethal complications – thrombembolic were marked especially in patients with absence removing of thrombotic basement of the left atrium and ligation of left atrium's auriculum. Remote period is charachterized by high frequency of thromboembolic complications and higher low risk of embolic-events in cases of perfoming of valve-preserving operations.

Key words: massive thromboses of left atrium, cardiopulmonary bypass, surgical treatment, mitral valve replacement, open mitral commissurotomy.